

76. Sur la classe projective d'un ensemble défini par l'induction transfinie.

Par Isamu NAKAHARA.

(Comm. by Z. SUTUNA, M.J.A., July 12, 1952.)

En 1936 M. C. Kuratowski a démontré¹⁾, que l'application de l'induction transfinie dans le domaine des ensembles projectifs ne conduit pas au dehors de ce domaine et évalué la classe projective d'un ensemble universel de ceux boreliens qui est donné par l'induction transfinie. Or, cette évaluation est améliorée en 1937 M. M. C. Kuratowski et J. v. Neumann²⁾. Ils ont donné un théorème fondamental sur l'induction transfinie et déterminé telle évaluation comme une application de lui. D'ailleurs, elle n'est pas parfait et d'ou, nous pouvons l'améliorer encore. Le but de cette note est de donner telle évaluation amélioré.

1. Nous commençons par quelques définitions sur les notions et les notations que nous employons dans la suite.

Soit $\{r_n\}$ ($n=1, 2, \dots$) une suite bien déterminée et fixée des nombres rationnels contenus dans l'intervalle $\langle 0, 1 \rangle$. Puis, pour un élément x du discontinu C de G. Cantor, nous désignons par M_x l'ensemble des nombres rationnels r_n tels qu'on ait $c_n=2$ dans la prolongation triadique de x :

$$x = \frac{c_1}{3} + \frac{c_2}{3^2} + \dots + \frac{c_n}{3^n} + \dots$$

où $c_n=0$ ou bien 2 et par \bar{x} le type de M_x par rapport à l'ordre naturel.

Nous posons encore

$$x_{(n)} = \frac{c_{1,2^n}}{3} + \frac{c_{3,2^n}}{3^2} + \dots + \frac{c_{(2^i-1)2^n}}{3^i} + \dots \quad (i=0, 1, 2, \dots)$$

pour un élément x de C et désignons par $x^{(n)}$ un nombre réel tel que $M_{x^{(n)}}$ se compose de tout r_i qui remplit $r_i < r_n$ s'il y a un nombre r_k dans M_x tel que $r_k \geq r_n$ et sinon, $x^{(n)}=0$. Puis, désignons par C_0 l'ensemble de x de C tel que M_x soit bien ordonné.

Maintenant, en désignant par $A(y)$ une fonction universelle pour les ensembles ouverts et ceux fermés et dont le domaine est C , nous définissons l'ensemble $L(x, y)$, où $x \in C_0$ et $y \in C_0$, par l'induction transfinie comme il suit,

$$L(0, y) = A(y),$$

1) C. R. Paris t. 202 (1936) et Fund. Math. t. 27 (1936).

2) Ann. of Math. Vol. 38 (1937).